

Estimados Apoderados:

Un cordial saludo a cada uno de ustedes. El presente informativo tiene por propósito recordarles que el día jueves 23 de septiembre se realizará el proceso de vacunación de nuestros niños, de acuerdo con el calendario del programa de vacunación nacional. Estas vacunas están entregadas por la autoridad sanitaria del país y su administración depende del Ministerio de Salud y del sistema público de salud; siendo de carácter obligatorio.

El colegio facilitará sus dependencias para la entrega de estas vacunas a nuestros estudiantes. Por ello, este jueves deben venir todos los estudiantes del turno correspondiente a **presencial** y se les sacará de clases en un momento del día, mientras que los estudiantes que siguen la clase **online** deberán presentarse en el colegio en las horas que se les indica para su vacunación y después pueden volver a su casa.

Los niños que vengan desde sus casas a la vacunación pueden venir acompañados de un adulto, que los esperará en el sector de entrada (sólo entran los niños) y tanto el estudiante como su acompañante deben llevar la mascarilla y seguir los protocolos de prevención diseñados por el Colegio para el Covid-19.

El horario de vacunación lo presentamos a continuación. Rogamos encarecidamente la puntualidad a los estudiantes que vienen desde sus casas para la vacuna:

Curso	Hora de llegada al colegio (alumnos online)	Turno de vacunación	Vacuna	Recomendaciones para el hogar:
1°A	09:30	09:40	- Tres Vírica: Sarampión, parotiditis (paperas) y rubeola - dTpa: Difteria, tétanos, pertusis (tos convulsiva o coqueluche)	Tres vírica: A partir de quinto día pueden aparecer manchas, pero pasan con los días. En caso de fiebre, desabrigue al niño, dele líquido y administre paracetamol de acuerdo con la dosis recomendada por su pediatra. Otros posibles síntomas de ambas vacunas: inflamación, enrojecimiento o dolor en la zona de la vacuna. Se recomienda dar abundante líquido y colocar paños húmedos y fríos en el brazo.
1°B	09:50	10:00		
4°A	10:10	10:20	- VPH: Virus Papiloma Humano (primera y segunda dosis)	Para varones y niñas. Es para prevenir el cáncer cérvico uterino y otras lesiones genitales asociadas al virus papiloma humano. Es posible que en el área de la vacuna se produzca inflamación, enrojecimiento o
4°B	10:30	10:40		
5°A	10:50	11:00		

5°B	11:10	11:20		dolor menor, para lo cual se recomienda dar abundante líquido y colocar paños húmedos y fríos en el brazo.
8°A	11:40	11:50	- dTpa: Difteria, tétanos, pertusis (tos convulsiva o coqueluche)	Posibles síntomas: inflamación, enrojecimiento o dolor en la zona de la vacuna. Se recomienda dar abundante líquido y colocar paños húmedos y fríos en el brazo.
8°B	12:00	12:10		

Cualquier consulta pueden hacerla a don Javier Salas (javier.salas@selcano.cl) o a don Luis Alberto Salvatierra (luis.salvatierra@selcano.cl). Agradecemos su colaboración.

Quedamos a su servicio,

Equipo de Gestión Escolar.